

16 – TEST DE L'AIMANT ★★★★★

En l'absence de signes cliniques posturaux, ou si l'on suspecte une cicatrice réactive ou encore face à une verticale de Barré négative ou face à un test de Romberg peu probant en apparence on utilisera le test de l'aimant.


Stimulation avec l'aimant au niveau du bord interne du pied :

En cas de plaintes, de douleurs patentes contrastant avec un examen postural normal, on place deux aimants de 1500 Gauss face nord au niveau du bord interne du pied dans un creux en avant et en dessous de la base du premier métatarsien à la jonction de la peau blanche et de la peau rouge.



Ces aimants permettent de faire apparaître deux types de signes cliniques visuels :

- La visualisation d'adaptation posturale des ceintures scapulaires et pelvienne qui basculent et tournent instantanément. Dans une statistique portant sur plus de 3000 patients étudiés, cette non-adaptation doit représenter moins de 5% des cas.




Résultat de la stimulation podale par aimants en l'absence de signes cliniques posturaux : apparition de bascules et girations des ceintures scapulaires et pelviennes.

Ces aimants vont aussi permettre la visualisation d'adaptation posturale des déviations latérales du corps



STIMULATION DU POINT P1



Résultat de la stimulation du point d'acupuncture P1 par aimants en l'absence de signes cliniques posturaux : apparition d'une verticale de Barré positive par exemple.