17 - CONCLUSION: LE TEST DE L'AIMANT DEBOUT (TDA)

A. Important

Ce test va permettre d'observer chez votre patient :

- Un syndrome postural généralisé grâce à la visualisation d'un Romberg antérieur ou postérieur.
- Un syndrome postural généralisé grâce à la visualisation d'une verticale de Barré positive
- Ce test est un catalyseur permettant de faire apparaître les signes cliniques.

B. Position du sujet


Le patient est debout pied à 30°, bouche fermée sans contact dentaire, les yeux ouverts regard à l'horizontale


C. Réalisation du test

En cas de plaintes, de douleurs patentes contrastant avec un examen postural normal, on place deux aimants de 1500 Gauss face nord au niveau du 1 du poumon, dans la dépression située sur le sillon delto pectoral en dessous de la coracoïde de l'omoplate.

D. Résultat du test

Résultat de la stimulation du point d'acupuncture P1 par aimants en l'absence de signes cliniques posturaux : apparition de bascules et girations des ceintures scapulaires et pelviennes ou d'une verticale de Barré en stade E.





AIMANT REPÉRÉ PAR SA FACE NORD ET POSITIONNE SUR LE 1 DU POUMON

SARL IRFOR Modèle Déposé Page 1